

SIGNES DE DANGER

Si un client/enfant présente l'un de ces signes, il ou elle est en danger de mort et doit être transporté(e) immédiatement vers l'établissement de santé le plus proche.

SIGNES DE DANGER
Convulsions ou crises actuellement ou au cours des 2 derniers jours
Coma/Perte de conscience
Le client/l'enfant est perturbé ou dort profondément - impossible de le réveiller
Extrême faiblesse – incapable de se tenir debout ou de s'asseoir sans aide
Très chaud – avec une température de 38,5 °C ou plus
Très froid – avec une température de 35 °C ou moins
Vomit tout - ne parvient pas à garder les liquides et les solides
Incapable de boire ou d'allaiter
Anémie grave – paumes, ongles des doigts, paupières très pâles
Yeux jaunes
Difficultés à respirer
Déshydratation grave - yeux enfoncés dans les orbites, creusement de la fontanelle, pincement de la peau, langue saburrale

Que faire si un client/enfant présente l'un de ces signes de danger :

1. Contrôler le sang à l'aide d'un dépistage rapide du paludisme
2. Si le test est :
POSITIF - Traiter le client/l'enfant avec un suppositoire antipaludéen (artésunate rectal)
NÉGATIF – Ne pas donner de médicament ; consulter plutôt un centre de santé pour le traitement.
3. Rédiger un formulaire d'orientation d'urgence – utiliser le **FORMULAIRE ROUGE**
4. Demander au soignant de transporter immédiatement le client/l'enfant vers l'établissement de santé le plus proche.

Toute maladie chez un nourrisson âgé de moins de 2 mois :

Un nourrisson peut rapidement tomber malade et être en grand danger.

Orienter sans délai le nourrisson vers l'établissement de santé le plus proche.
– utiliser le **FORMULAIRE ROUGE**

NE PAS DONNER D'ARTÉSUNATE RECTAL
ni aucun autre médicament car cela peut être dangereux pour un nourrisson.