

## SIGNES DE DANGER

*Si un enfant présente l'un de ces signes, il ou elle est en danger de mort et doit être transporté(e) immédiatement vers l'établissement de santé le plus proche.*

### SIGNES DE DANGER

**Convulsions ou crises** actuellement ou au cours des 2 derniers jours

**Coma/Perte de conscience**

**Le patient est perturbé ou dort profondément** - impossible de le réveiller

**Extrême faiblesse** – incapable de se tenir debout ou de s'asseoir sans aide

**Très chaud** – avec une température de 38,5 °C ou plus

**Très froid** – avec une température de 35 °C ou moins

**Vomit tout** - ne parvient pas à garder les liquides et les solides

**Incapable de boire ou d'allaiter**

**Anémie grave** – paumes, ongles des doigts, paupières très pâles

**Yeux jaunes**

**Difficultés à respirer**

**Déshydratation grave**

- yeux enfoncés dans les orbites, creusement de la fontanelle, pincement de la peau, langue saburrale

Que faire si un enfant présente l'un de ces signes de danger :

1. Contrôler le sang à l'aide d'un dépistage rapide du paludisme
2. Si le test est :  
POSITIF - Traiter l'enfant avec un suppositoire antipaludéen (artésunate rectal)  
NÉGATIF – Ne pas donner de médicament ; consulter plutôt un centre de santé pour le traitement.
3. Rédiger un formulaire d'orientation d'urgence – utiliser le **FORMULAIRE ROUGE**
4. Demander au soignant de transporter immédiatement l'enfant vers l'établissement de santé le plus proche.

### Toute maladie chez un nourrisson âgé de moins de 2 mois :

Un nourrisson peut rapidement tomber malade et être en grand danger. Orienter sans délai le nourrisson vers l'établissement de santé le plus proche.

– utiliser le **FORMULAIRE ROUGE**

**NE PAS DONNER D'ARTÉSUNATE RECTAL**  
ni aucun autre médicament car cela peut être dangereux pour un nourrisson.