

AUTRE SIGNES POUR ORIENTATION VERS UN SPÉCIALISTE

L'un de ces signes chez un enfant présentant de la fièvre suggère qu'il a une maladie (paludisme ou autre) qui peut seulement être traitée avec des médicaments que l'on trouve dans l'établissement de santé la plus proche.

AUTRES SIGNES POUR ORIENTATION VERS UN SPÉCIALISTE
Fièvre qui a duré plus de 7 jours
Fièvre avec une température (mesurée) de 37 °C ou plus, et un résultat <u>négatif</u> au test de dépistage du paludisme
Vomissements <u>et</u> diarrhée
Sang dans les selles ou les urines
Miction douloureuse ou fréquente
Plaie ou brûlures
Abcès à la peau
Gonflements ou grosseurs douloureux sous la peau
Infection à l'oreille (écoulement à l'oreille ou l'enfant se tire l'oreille)
Yeux collants ou rouges
Fièvres chez les bébés de moins de 4 ans

Que faire si un enfant présente l'un de ces autres signes :

1. Informer que l'enfant a probablement une autre maladie (paludisme ou autre) qui peut seulement être traitée avec des médicaments que l'on trouve dans l'établissement de santé le plus proche.
2. Informer que l'enfant doit être examiné par un personnel de santé qualifié
3. Rédiger un formulaire d'orientation d'urgence – utiliser le

FORMULAIRE BLEU

Fièvres chez les bébés de moins de 4 ans :

Orienter les bébés de moins de 4 ans vers l'établissement de santé le plus proche pour examen et traitement

- utiliser le FORMULAIRE BLEU

NE PAS DONNER DE CO-ARTEM
Ni aucun autre médicament car cela peut être dangereux.