

## SINAIS DE PERIGO

*Se uma criança exibir alguns destes sinais de perigo, poderá falecer, pelo que deve ser imediatamente levada à infraestrutura de saúde mais próxima*

SINAIS DE PERIGO
<b>Convulsões ou ataques</b> na sua presença ou nos últimos 2 dias
<b>Coma / perda de consciência</b>
<b>O paciente está confuso ou muito sonolento</b> – não é possível acordá-lo facilmente
<b>Fraqueza extrema</b> – incapacidade para ficar em pé ou sentado sem apoio
<b>Temperatura corporal muito elevada</b> – temperatura corporal de 38,5°C ou superior
<b>Temperatura corporal muito reduzida</b> – temperatura corporal de 35,0°C ou inferior
<b>Vomita tudo</b> - não consegue manter alimentos sólidos ou líquidos no organismo
<b>Incapaz de beber ou mamar</b>
<b>Anemia grave</b> – palidez extrema nas palmas das mãos, unhas ou pálpebras
<b>Olhos amarelos</b>
<b>Dificuldade em respirar</b>
<b>Desidratação grave</b> – olhos encovados, fontanela encovada, pregas na pele ao beliscar, língua revestida

O que fazer se uma criança exibir qualquer um destes sinais de perigo:

1. Analisar o sangue utilizando o teste de diagnóstico rápido da malária
2. Se o teste for:
  - POSITIVO - Tratar a criança com um supositório para a malária (artesanato de aplicação rectal)
  - NEGATIVO - Não dar qualquer medicamento; em vez disso, encaminhar para a unidade de saúde para receber tratamento
3. Escrever um formulário de encaminhamento de urgência – usar o **FORMULÁRIO VERMELHO**
4. Dar instruções ao responsável para levar imediatamente a criança à unidade de saúde mais próxima

### Qualquer doença num bebé com menos de 2 meses de idade:

Os bebés muito jovens podem ficar gravemente doentes num curto espaço de tempo.

Encaminhar imediatamente o bebé para a infraestrutura de saúde mais próxima – usar o **FORMULÁRIO VERMELHO**

NÃO ADMINISTRAR ARTESUNATO DE APLICAÇÃO RECTAL ou qualquer outro medicamento, já que poderá não ser seguro fazê-lo num bebé